

Desinfektionsplan Ambulante Pflege – Mobil (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren) Hände und Haut





Was	Wann	Womit (Konzentration/ Einwirkzeit)	Wie	Wer
Händedesinfektion hygienisch	<ul style="list-style-type: none"> • Vor und nach Kontakt mit Kunden. • Vor aseptischen Tätigkeiten. • Nach Kontakt mit (potenziell) infektiösem Materialien/ Oberflächen. • Nach Kontakt zu Oberflächen in der unmittelbaren Kundenumgebung. • Vor jedem Anlegen und nach jedem Ablegen von PSA inkl. Schutzhandschuhen. • Vor dem Umgang mit Lebensmitteln. • Nach dem Verlassen der Kundenwohnung. 	_____	<p>Händedesinfektionsmittel in trockene, hohle Hände geben und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten, ggf. nachbenetzen. Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze besonders beachten. Unterarme bei Kontamination mit desinfizieren.</p> <p>Hinweise bei Verschmutzung: Zuerst mechanisch reinigen (mit Wasser abspülen oder mit einem sauberen, trockenen Einmaltuch), danach desinfizieren.</p>	Alle Mitarbeitende _____ _____ _____
Hautdesinfektion		_____	<p>Hautstelle satt benetzen, ggf mit sterilem Tupfer abreiben, erneut benetzen.</p> <p>Alternativ: Mit sterilem, getränktem Tupfer gleichmäßig abreiben. Einwirkzeit einhalten, nicht trocken reiben.</p>	_____ _____ _____
Schleimhaut-Antisepsis			<p>Schleimhaut inspizieren.</p> <p>Antiseptikum einmalig gezielt mit sterilem Tupfer/ Applikator auftragen. Augenkontakt vermeiden.</p> <p>Einwirkzeit laut Hersteller beachten. Nicht abwischen, außer medizinisch erforderlich.</p>	_____ _____ _____



Was	Wann	Womit (Konzentration/ Einwirkzeit)	Wie	Wer
Arbeitsflächen für aseptische Tätigkeiten	• Vor jeder Nutzung.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
Häufig berührte Flächen im häuslichen Umfeld (z. B. Griffe, Lichtschalter)	• Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
Selten berührte Flächen von Mobiliar sowie Ausstattung	• Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
Empfindliche Oberflächen (z. B. Handy, Tablet, Handscanner)	• Sofort bei Kontamination.	_____	Aufbereitungshinweise der Hersteller und Materialverträglichkeiten beachten! Bei elektrischen Pflegehilfsmitteln/Geräten spannungslosen Zustand sicherstellen. Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
Flächen im Auto (z. B. Lenkrad, Schaltknüppel, Handbremse, Türgriff)	• Täglich nach Arbeitsschluss. • Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____

Desinfektionsplan Ambulante Pflege – Mobil (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren) Fläche / Sonstiges

	Was	Wann	Womit (Konzentration/ Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Fläche	Hilfsmittel zur Pflege, Mobilisation und Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • Personenbezogen: Sofort bei Kontamination und vor Weitergabe an andere Personen. • Personenübergreifend: Sofort nach Gebrauch und sofort bei Kontamination. • Sonstige Intervalle für Hilfsmittel zur Mobilisation: Vor Reparatur oder Rückgabe. 	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p> <p>Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____
	Sanitärobjekte und angrenzende Flächen (Waschbecken inkl. Armaturen, Toiletten)	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort bei Kontamination. • Bei Verdacht oder Vorliegen von Infektionskrankheiten zusätzlich nach jeder Nutzung, bei jedem Einsatz. 	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p> <p>Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____
 Sonstiges	Doku-Mappen (außen) Pfllegetasche / Pfllegerucksack (außen)	<ul style="list-style-type: none"> • Sofort bei Kontamination. • Bei Verdacht oder Vorliegen von Infektionskrankheiten, nach jedem Einsatz. 	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____
					_____ _____ _____
					_____ _____ _____

Allgemeine Hinweise

Wiederbenutzung von Flächen (RKI):

- **Routinemäßige Desinfektion:** Nutzung, sobald die Fläche sichtbar trocken ist.
- **Gezielte Desinfektion (z. B. nach Kontamination, vor aseptischen Tätigkeiten, bei speziellen Erregern, Desinfektion von Flächen mit nachträglicher Trinkwasserspülung):** Einwirkzeit laut Herstellerangaben vollständig abwarten.

Sicherheit:

- Desinfektionsmittel gemäß Herstellerangaben verwenden – Materialverträglichkeiten prüfen.
- Geeignete Schutzausrüstung (PSA) tragen.
- Vor der Desinfektion sichtbare Verschmutzungen mit einem Einmaltuch entfernen (Eiweißfixierung vermeiden).
- Kontaktflächen mit Lebensmitteln oder Haut nach der Desinfektion – sofern vom Desinfektionsmittelhersteller vorgesehen – mit Trinkwasser spülen.

Grundlage:

- Der Desinfektionsplan wurde auf Grundlage der RKI-/KRINKO-Empfehlungen und der TRBA 250 erstellt und umfasst die routinemäßige Desinfektion mit einem Wirkungsspektrum einschließlich „begrenzt viruzid PLUS“ (Wirksamkeit gegen behüllte Viren sowie zusätzlich bestimmte unbehüllte Viren (Noro-, Rota- und Adenoviren)).

Wichtiger Hinweis:

- Bei Verdacht oder bestätigten Infektionskrankheiten sind ergänzend die im Plan: „Spezielle Maßnahmen ...“ aufgeführten Regelungen zu berücksichtigen und anzuwenden.

Verantwortung:

- Die Verantwortung für die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.
- Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Desinfektionsmittel dem erforderlichen Wirkungsspektrum entsprechen und ordnungsgemäß angewendet werden.