

# Desinfektionsplan Ambulante Pflege – Zentrale (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren)

Hände und Haut / Fläche

	Was	Wann	Womit (Konzentration/ Einwirkzeit)	Wie	Wer
 <b>Hände- desinfektion</b>	<b>Händedesinfektion hygienisch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Arbeitsbeginn / nach Arbeitsende.</li> <li>• Vor aseptischen Tätigkeiten.</li> <li>• Nach Kontakt mit (potenziell) infektiösem Materialien/ Oberflächen.</li> <li>• Vor jedem Anlegen und nach jedem Ablegen von PSA inkl. Schutzhandschuhen.</li> <li>• Vor dem Umgang mit Lebensmitteln.</li> </ul>	_____	<p>Händedesinfektionsmittel in trockene, hohle Hände geben und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten, ggf. nachbenetzen. Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze besonders beachten. Unterarme bei Kontamination mit desinfizieren.</p> <p>Hinweise bei Verschmutzung: Zuerst mechanisch reinigen (mit Wasser abspülen oder mit einem sauberen, trockenen Einmaltuch), danach desinfizieren.</p>	Alle Mitarbeitende _____ _____ _____
 <b>Fläche</b>	<b>Arbeitsflächen für aseptische Tätigkeiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor jeder Nutzung.</li> </ul>	_____	Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
	<b>Häufig berührte Flächen (z. B. Griffe, Lichtschalter, Tische)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Täglich.</li> <li>• Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____ _____
	<b>Selten berührte Flächen von Mobiliar sowie Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	Flächen vollständig mit desinfektionmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____ _____
	<b>Empfindliche Oberflächen (z. B. Telefone, PC-Tastaturen, Monitore)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	<p><b>Aufbereitungshinweise der Hersteller und Materialverträglichkeiten beachten!</b> Bei elektrischen Pflegehilfsmitteln/Geräten spannungslosen Zustand sicherstellen.</p> <p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____ _____

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

# Desinfektionsplan Ambulante Pflege – Zentrale (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren) Fläche



Fläche


Was	Wann	Womit (Konzentration/ Einwirkzeit)	Wie	Wer
<b>Medikamentenschrank</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktflächen außen: Täglich und sofort bei Kontamination.</li> <li>• Innenraum: Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____ _____
<b>Hilfsmittel im Lagerbestand (z. B. Thermometer, Verbandkoffer, Blutdruckmanschetten, Rollstuhl, Gehilfe)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei sichtbarer Verschmutzung.</li> <li>• Vor Ausgabe zum ersten Einsatz.</li> </ul>	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p> <p>Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____ _____
<b>Dosetten / Medikamentenkörbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____ _____
<b>Pflegerucksack / Pfllegetasche innen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____ _____
<b>Sanitärobjekte und angrenzende Flächen (Waschbecken inkl. Armaturen, Toiletten)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Täglich.</li> <li>• Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p> <p>Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____ _____

# Desinfektionsplan Ambulante Pflege – Zentrale (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren) Fläche



Was	Wann	Womit (Konzentration/ Einwirkzeit)	Wie	Wer
<b>Spender (Händehygiene)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedienhebel: Täglich und sofort bei Kontamination.</li> <li>• Äußere Gehäuse und alle von außen zugänglichen Teile: Wöchentlich und sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p> <p>Vollständige Spenderaufbereitung erfolgt gemäß der Aufbereitungshinweise von den Herstellern der Spendersysteme.</p>	_____ _____ _____ _____
<b>Reinigungsutensilien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Täglich am Ende des Desinfektions-/ Reinigungseinsatzes.</li> <li>• Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p> <p>Textile Reinigungsutensilien in geeigneten, gekennzeichneten Behältnissen sammeln und der hygienischen Aufbereitung (desinfizierendes Waschverfahren) zuführen.</p> <p>Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – Bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____ _____
<b>Abfallbehälter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Täglich nach Entleerung.</li> <li>• Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	<p>Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____ _____
<b>Fußboden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort bei Kontamination.</li> </ul>	_____	<p>Fußboden systematisch im S-Muster wischen. Für jeden Raum oder Bereich frischen Bezug verwenden (Bezugs-Wechselmethode).</p> <p>Flächen über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.</p>	_____ _____ _____ _____

# Desinfektionsplan Ambulante Pflege – Zentrale (einschließlich Noro-, Rota-, Adenoviren) Sonstiges

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Sonstiges					_____
					_____
					_____
					_____
					_____
					_____

## Allgemeine Hinweise

### Wiederbenutzung von Flächen (RKI):

- **Routinemäßige Desinfektion:** Nutzung, sobald die Fläche sichtbar trocken ist.
- **Gezielte Desinfektion (z. B. nach Kontamination, vor aseptischen Tätigkeiten, bei speziellen Erregern, Schlussdesinfektion, Desinfektion von Flächen mit nachträglicher Trinkwasserspülung):** Einwirkzeit laut Herstellerangaben vollständig abwarten.

### Sicherheit:

- Desinfektionsmittel gemäß Herstellerangaben verwenden – Materialverträglichkeiten prüfen.
- Geeignete Schutzausrüstung (PSA) tragen.
- Vor der Desinfektion sichtbare Verschmutzungen mit einem Einmaltuch entfernen (Eiweißfixierung vermeiden).
- Kontaktflächen mit Lebensmitteln oder Haut nach der Desinfektion – sofern vom Desinfektionsmittelhersteller vorgesehen – mit Trinkwasser spülen.

### Grundlage:

- Der Desinfektionsplan wurde auf Grundlage der RKI-/KRINKO-Empfehlungen und der TRBA 250 erstellt und umfasst die routinemäßige Desinfektion mit einem Wirkungsspektrum einschließlich „begrenzt viruzid PLUS“ (Wirksamkeit gegen behüllte Viren sowie zusätzlich bestimmte unbehüllte Viren (Noro-, Rota- und Adenoviren)).

### Wichtiger Hinweis:

- Bei Verdacht oder bestätigten Infektionskrankheiten sind ergänzend die im Plan: „Spezielle Maßnahmen ...“ aufgeführten Regelungen zu berücksichtigen und anzuwenden.

### Verantwortung:

- Die Verantwortung für die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.
- Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Desinfektionsmittel dem erforderlichen Wirkungsspektrum entsprechen und ordnungsgemäß angewendet werden.